

Empecid[®]



Antimicótico Polvo

Venta Libre
Uso externo
Ind. Brasileira

Composición

Cada 100 g de polvo contienen:

Clotrimazol 1,0 g
en un excipiente de almidón de arroz.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION

Acción terapéutica

Antimicótico.

Indicaciones

Tratamiento de diferentes micosis o infecciones por hongos tales como pie de atleta (tinea pedis), tiña crural (pliegues de ingles), y tiña corporal (tinea corporis) que habitualmente se acompañan de picazón, ardor, descamación, agrietamiento y mal olor.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Dosis

Empecid polvo se aplica en la zona afectada 2 veces por día o según indicación médica.

Para la profilaxis del pie de atleta se aconseja la aplicación del polvo en el interior de los zapatos y medias por la mañana para eliminar la humedad y evitar la reinfección.

Modo de uso

Lavar la zona afectada con agua y jabón y secar cuidadosamente. Aplicar sobre la zona afectada por la mañana y por la tarde. Para el pie de atleta, prestar especial atención a los espacios entre los dedos. Es conveniente

utilizar zapatos cómodos, ventilados y cambiarse los zapatos y las medias al menos una vez al día. En el caso del pie de atleta (micosis de los pies) y tinea corporis (micosis de la piel del cuerpo) la duración del tratamiento es por lo general de 4 semanas y en caso de tinea cruris (micosis de los pliegues) de 2 semanas. Si los síntomas persisten por más tiempo o empeoran consulte a su médico.

El uso del producto debe ser supervisado en niños menores de 12 años. Este producto no es efectivo en el cuero cabelludo y uñas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Precauciones

Sólo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos. No usar en niños menores de 2 años de edad, excepto bajo supervisión médica.

Si aparece irritación, o si no presenta mejoría dentro de las 4 semanas de tratamiento (en el caso de pie de atleta o tinea corporis) o de 2 semanas (tinea cruris) se deberá suspender el tratamiento y consultar al médico.

Presentación

Envase con 30 g.

No almacenar a temperaturas superiores a los 25° C.

Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

En Argentina: En caso de ingestión accidental llamar al:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG**, Alemania, por Bayer S.A., Rua Domingos Jorge 1000, San Pablo, Brasil. Dir. Téc.: Shidue Ishitani.

En Argentina: Importado y distribuido por Bayer S.A., R. Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro, Pcia. de Bs. As., Argentina. Dir. Téc.: R. D. González, Farm. Esp. medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.470. Venta Libre.

En Paraguay: Representa y Distribuye Bayer S.A. Avda. Aviadores del Chaco 2665 esq. Molas López Tel.: 614-888 - Asunción, Paraguay. Dir. Téc.: V. P. Acosta Ubaldi. Reg. Prof.: 1.869. Venta Autorizada por D.N.V.S. M.P.S. - B.S. Reg. N° 0218/1101-02 - Venta Bajo Receta.

En casos de sobredosis acudir al Centro Nacional de Toxicología - Emergencias Médicas Prof. Dr. Luis M. Argaña Tel.: 204-800.