

Empecid® Spray

En Argentina Venta libre
Industria Argentina
En Paraguay Venta Bajo Receta

LEER CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EMPECID®

¿Qué contiene EMPECID®?

Cada 100 ml de spray contiene ingredientes activos: Clotrimazol 1,0 g e ingredientes inactivos: polietilenglicol 400, miristato de isopropilo e isopropanol.

Acciones:

Antimicótico.

¿Para qué se usa EMPECID®?

EMPECID® se usa para el tratamiento de diferentes infecciones causadas por hongos, habitualmente se acompañan de manchas, picazón, ardor, descamación, agrietamiento y mal olor.

¿Qué personas no pueden utilizar EMPECID®?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar EMPECID®?

Evite el contacto con los ojos, no ingerir, este producto es de uso externo únicamente.
No utilizar EMPECID® en niños menores de 12 años, excepto bajo supervisión médica.
Este producto no es efectivo en el cuero cabelludo y uñas.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando EMPECID®?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por EMPECID®, como reacciones alérgicas, ampollas, molestias/dolor, edema, irritación,

descamación y ardor.

En el caso de que aparezca irritación, o si no presenta mejoría dentro de las 4 semanas de tratamiento deberá suspenderlo y consultar al médico.

¿Cómo se usa EMPECID®?

EMPECID® se aplica en la zona afectada, con el frasco en posición vertical 2 veces por día o según indicación médica.
Antes de la aplicación oprimir una o más veces el mecanismo atomizador para obtener un funcionamiento correcto.

Modo de uso

Lavar la zona afectada con agua y jabón y secar cuidadosamente.
Aplicar sobre la zona afectada por la mañana y por la tarde.
Para infecciones en los pies, prestar especial atención a los espacios entre los dedos. Es conveniente utilizar zapatos cómodos, ventilados y cambiarse los zapatos y las medias al menos una vez al día.
En el caso de infecciones en la piel de los pies (pie de atleta) e infecciones en el cuerpo (tinea corporis) la duración del tratamiento es por lo general de 3 a 4 semanas.
En el caso de infecciones en la piel de los pliegues, la duración del tratamiento es habitualmente 2 semanas.
Si los síntomas persisten por más tiempo o empeoran consulte a su médico.
El uso del producto debe ser supervisado en niños menores de 12 años.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Centros de Toxicología:

*En Argentina

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel. (011) 4962-6666/2247.
Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel. (0221) 451-5555.

*En Paraguay:

Centro Nacional de Toxicología – Emergencias Médicas. Teléfono: 204-800

¿Tiene usted alguna pregunta?

En Argentina llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Forma de conservación: No almacenar a temperaturas superiores a los 25 °C.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania en Coronel Méndez N°438/440, Wilde, Pcia. de Buenos, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Dir. Téc.: José Luis Role, Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Cert. Nro. 34470

En Paraguay Representa y Distribuye Bayer S.A.
Avda. Santa Teresa 2245 casi Avda. Aviadores del Chaco
Asunción – Paraguay. Teléfono: 617-3500
D.T.: Verónica P. Acosta Ubaldi – Reg. Prof.: 1.869
Venta autorizada por D.N.V.S. – M.S.P. y B.S.
Certificado N° 07071-04-EF.
Venta Bajo Receta.

Presentaciones: Envase con 60 ml.

Edición: Empecid spray Dispo 0753/12
Rev.

